


PROCÉDURE EN CAS DE CRISE D'ÉPILEPSIE

1. AU DÉCLENCHEMENT DE MA CRISE



2. SI MA CRISE PERSISTE

APPLIQUER MON PROTOCOLE MÉDICAL !

Penser à noter l'heure où vous m'administrez le traitement

Ne vous inquiétez pas si le traitement me fait dormir...

Si je **NE** dispose **PAS** d'un protocole médical

Appeler la **personne référente**

A DÉFAUT

Joindre les **services d'urgences**

15

Samu

18

Pompiers

114

Urgence SMS

112

Europe

3. APRÈS MA CRISE

Si je **reviens à moi**

- Me mettre en Position Latérale de Sécurité
- Me couvrir (si j'ai froid)
- **NE PAS ME DONNER À BOIRE !**
- Me parler, me rassurer, m'expliquer ce qui s'est passé !
- Je peux m'endormir après ma crise...

Si je suis toujours **inconscient(e)** ou si la **crise ne cesse pas**, commencer les gestes de **premiers secours**

RESTEZ AUPRÈS DE MOI

ÉPILEPSIES ET CRISES D'ÉPILEPSIES

LES ÉPILEPSIES


Maladies neurologiques causées par des décharges électriques excessives de neurones dans le cerveau, provoquant la répétition de **crises épileptiques**

CRISES FOCALES (partielles)




CRISES GÉNÉRALISÉES

Peuvent se généraliser



OU



OU




OU



OU

- Geste automatique
- Sensation de fourmillement
- Augmentation du rythme cardiaque
- Phénomènes visuels
- Hallucinations
- Impression de déjà vu
- ...



OU



OU



QUAND ?



Se référer à **mes consignes médicales** !

QUOI ?




[Couleur différente selon la posologie]

Bouchon du tube de protection

Bague d'inviolabilité

Capuchon rouge




Seringue

Protocole du BUCCOLAM®
à décoller du tube


Piston de la seringue

COMMENT ?




1. Retirer le bouchon du tube de protection
[La bague d'inviolabilité doit se déchirer]

2. Sortir la seringue de BUCCOLAM®



3. Retirer le capuchon rouge à son extrémité
[Si l'embout interne transparent reste fixé sur la seringue, il faut le retirer manuellement
Ne pas fixer d'aiguille sur la seringue]



4. Mettre un objet souple sous ma tête ou la mettre contre vous de sorte à avoir les mains libres. Me mettre sur le côté



5. Insérer la seringue entre ma joue et mes gencives
Appuyer lentement sur le piston de la seringue pour délivrer doucement la dose complète du BUCCOLAM®
[Le BUCCOLAM® ne doit pas ressortir de ma bouche : si nécessaire, mettre la moitié de la dose d'un côté de ma bouche et l'autre moitié de l'autre côté]



Noter l'heure d'administration et conserver la seringue vide dans le tube
RESTEZ AUPRÈS DE MOI